

رعایت ایمنی بیمار

کلیه فراگیران موظف هستند که نسبت به استقرار شاخصهای ایمنی بیمار (مرگ و میر - زخم بستر - سقوط از تخت - عفونتهای بیمارستانی خطاهای بیمارستانی) متعهد باشند و ایمنی بیمار را که یکی از ارزشهای سازمانی پورسینا و از اولویتهای استراتژیک مرکز بوده و در برنامه استراتژیک لحاظ گردیده ، در سرلوحه کار خود قرار دهند و ضمن همکاری با کمیته های مربوطه خود را ملزم به رعایت الزامات ایمنی بیمار بدانند و نسبت به گزارش خطاهای درمانی برای به مشارکت گذاشتن تجارب و جلوگیری از تکرار مجدد خطاها کمک نمایند.

عفونت بیمارستانی

عفونتی که 48-72 ساعت پس از پذیرش بیمار در بیمارستان ایجاد می شود بشرطی که در زمان پذیرش علائم آشکار عفونت را نداشته و بیماری در دوره کمون خود نباشد . عفونت بیمارستانی می تواند از محیط کسب شود یا توسط فلور داخلی بیمار ایجاد شود. براساس نظام مراقبت عفونتهای بیمارستانی NNIS چهار عفونت زیر توسط تیم کنترل عفونت روزانه شناسایی میگردد.

الف) علائم و نشانه های عفونت جراحی

ب) علائم و نشانه های عفونت ادراری

ج) علائم و نشانه های عفونت خونی

د) علائم و نشانه های پنومونی

رعایت ایمنی فراگیران از لحاظ کنترل عفونت

رعایت موازین کنترل عفونت و احتیاطات استاندارد درحیطه کنترل عفونت و بهداشت محیط - شرکت در کلاسها و سمینارهای کنترل عفونت و بهداشت محیط جهت آشنایی باموازین کنترل عفونت و بهداشتی

- مطالعه پمفلت ها و تراکتهای آموزشی کنترل عفونت و بهداشت محیط براساس آخرین دستورالعمل و بخشنامه های وزارتخانه
- تشکیل پرونده بهداشتی
- اقدام جهت تزریق واکسن هپاتیت و واکسن کرونا
- تعیین تیتر آنتی بادی جهت دریافت واکسن
- استفاده از تجهیزات حفاظت فردی (دستکش - ماسک - عینک محافظ - کلاه)....-هنگام انجام پروسیجرهای درمانی
- گزارش و پیگیری به موقع و سریع مواجهات شغلی (نیدل استیک ، پاشیدن خون و ترشحات به داخل چشم و مخاط ها)

مهمترین و شایعترین راه انتقال عفونت ، تماس است

- تماس مستقیم حین مراقبت از بیمار
 - تماس غیر مستقیم (اشیاء دست آلوده و پانسمان
 - از راه قطرات (سرفه - عطسه - صحبت - برونکوسکوپی و ساکشن.)
- دست پزشکان ، پرستاران ، فیزیوتراپها و سایر افرادی که بنحوی با بیماران سر و کار دارند یا از آنها مراقبت میکنند مهمترین ابزار انتقال عفونت محسوب می شود.