



بریدگی انگشتان

نام پزشک: آقای دکتر صفری

متخصص ارتوپدی و فلوشیپ ستون فقرات

تهیه و تنظیم: خانم حسین زاده

منبع: کتاب برونرسودارت - داخلی، جراحی

سال تهیه: بهار ۱۴۰۳



اگر تاندون بیمار پاره شود انگشتان بیمار خم می شود ولی بیمار قادر به باز کردن انگشتان نمی باشد که در این صورت حتما نیاز به عمل جراحی دارد. در صورتی که بیمار دیر مثلا ۳ تا ۴ هفته بعد مراجعه کند مساله ترمیم وارد مرحله دیگری می شود و جراحی به علت چسبندگی و جابجایی تاندون ها دشوارتر خواهد شد.

توجهات:

*در صورتی که زخم بیمار بعد از عمل باز باشد ابتدا با سرم نرمال سالین شست و شو داده بعد با گاز استریل خشک کرده و سپس پانسمان میکنیم.

*در صورتی که زخم بیمار بعد از عمل بسته باشد (بخیه داشته باشد) ابتدا با بتادین ضد عفونی کرده و سپس با گاز استریل پانسمان می کنیم.

*هنگام استحمام حتما زخم را با دو لایه پلاستیک می پوشانیم تا آب به آن نفوذ نکند و زخم خیس نشود.

اقدامات:

خونریزی را با وارد کردن فشار مستقیم و بالا نگه داشتن عضو متوقف کنید. برای مراقبت از عضو قطع شده آن را در یک گاز استریل یا دستمال تمیز بپیچانید و بعد درون یک کیسه پلاستیکی قرار دهید و سر آن را محکم گره زده و سپس داخل یک کیسه یخ قرار دهید. کیسه حامل عضو و مصدوم را به بیمارستان انتقال دهید.

قطع شدن انگشت دست



درمان:

اگر زخم عمیق باشد با بخیه ترمیم می شود. بخیه جلوی عفونت را میگیرد و کمک می کند زخم به شکل بهتری جوش بخورد. بیمار حتما باید آنتی بیوتیک خوراکی یا موضعی طبق دستور پزشک مصرف نماید.

تعریف:


ممکن است بریدگی انگشتان به صورت زخم باز باشد.

زخم باز یک جراحت در سطح پوست است که باعث نمایان شدن قسمت های زیر پوست شده و عمدتاً موجب خونریزی خارجی می شود. این نوع زخم ها در هر قسمتی به سرعت عفونی شده و میکروب ها می توانند سریع به لایه های عمقی تر پوست گسترش یابند. بنابراین روی تمام زخم ها باید به درستی تمیز و پوشانده شود.

پوشاندن سطح زخم به کنترل خونریزی- جلوگیری از آلودگی- جذب خون و ترشحات زخم کمک می کند و موجب التیام سریع زخم می شود.

انواع زخم باز:

۱. **خراشیدگی یا ساییدگی:** این نوع زخم بر اثر ساییده شدن لایه فوقانی پوست ایجاد می شود به دلیل آن که بیشتر اعصاب این لایه آسیب می بیند زخم دردناک ولی خونریزی قابل توجه نیست. اگر خراشیدگی وسیع باشد یا ذرات خاک یا اجسام خارجی در آن فرورفته باشد می تواند خطرناک باشد.



اقدامات: چنانچه جسم خارجی به طور سطحی در پوست فرورفته است آن را به آرامی با آب و صابون بشویید و زخم را با بتادین ضدعفونی کنید.

۲. **بریدگی:** زخمی است که لبه های صاف داشته و شبیه بریدگی با لبه کاغذ است. این نوع زخم سوزش و خونریزی زیادی دارد و بسته به عمق بریدگی متفاوت است.

۳. **پاره شدگی:** زخمی است عمیق که لبه های ناصاف داشته و در اثر اجسام تیزی مانند شیشه ایجاد می شود. در این نوع زخم احتمال خونریزی زیاد است.

اقدامات:

در این بریدگی لبه های زخم را به هم نزدیک کرده و عضو را بی حرکت و کمی بالاتر از سطح قلب قرار داده تا از درد و خونریزی کاسته شود. زخم را ضدعفونی و پانسمان کنید و مصدوم را به نزدیکترین مرکز انتقال دهید.

مقداری یخ خرد شده در یک کیسه پلاستیکی خشک قرار داده و آن را روی گچ یا آتل قرار دهید.

انگشتان دست را مرتب تکان دهد.

۴. **کنده شدگی:** زخمی است مستقل از پوست یا عضله که از بدن جدا شود.

اقدامات: سطح زخم را تمیز کرده و مانع خونریزی شوید و بلافاصله مصدوم را به نزدیکترین مرکز انتقال دهید.

۵. **قطع عضو:** این نوع جراحت شدیدترین نوع زخم های خونریزی دهنده است و اغلب به وسیله یک جسم برنده صنعتی آلوده اتفاق می افتد.