



پانسمان آمینون

تاییدکننده: آقای دکتر رنجبر

فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی

تهیه: آقای خاکپور

منبع: سوختگی های کودکان تالیف

دکتر نور صالحی

سال تهیه: بهار ۱۴۰۳



از مایعات کافی استفاده کنید.


از مواد غذایی حاوی ویتامین A که در سبزیجات و غذاهایی که رنگ های سبز و زرد و نارنجی دارند.

بیشتر است مانند هویج و فلفل های رنگی و جگر بیشتر استفاده کنید.

از غذاهایی که حاوی ویتامین C مثل کلم ، فلفل دلمه ای و میوه هایی مثل لیمو و پرتقال بیشتر استفاده کنید.

از مواد غذایی که حاوی پروتئین هستند مانند ماست و پنیر ، گوشت و تخم مرغ بیشتر استفاده کنید.

از مواد غذایی حاوی روی مثل گوشت گوساله ، ماهی و جگر و مغزجاتی مانند پسته ، بادام و گرد و استفاده کنید.



پانسمان آمنیون:

روشهای مختلفی برای درمان موضعی زخم سوختگی وجود دارد.

پرده آمنیون به عنوان یک پانسمان بیولوژیک در سوختگی ها استفاده میشود.

پرده آمنیون از جفت مادران باردار پس از انجام عمل جراحی سزارین و در شرایط استریل گرفته می شود و نمونه های خون جهت انجام آزمایشات هیپاتیت و ایدز از آنها گرفته و به آزمایشگاه فرستاده می شود.

از پرده آمنیون برای زخم های درجه ۲ و بافت های تازه استفاده میشود.



1

مزایای پانسمان آمنیون

از اتلاف حرارت بدن ، تبخیر آب و الکترولیتها و پروتئین از راه زخم جلوگیری و آن را حفاظت می نماید.


به راحتی گذاشته و برداشته می شود.

از خشک شدن بافت تازه جلوگیری و آن را حفاظت می نماید.

با پوشاندن و محافظت کردن از پایانه های عصبی باعث کاهش درد بیمار می شود.

سد موثری در برابر باکتریها بوجود می آید.

سطح زخم را یکنواخت و هموار می کند و آن را برای انجام پیوند پوست آماده می سازد.




2

مدت زمان این پانسمان معمولا بین ۵ تا ۷ روز است البته این پانسمان بسته به نظر پزشک معالج و شرایط بیمار نیز تعویض می شود.

بعد از باز شدن هر روز با شامپو بچه محل زخم را با آب ولرم شستشو داده و با یک حوله تمییز و اتوکشیده محل را خشک کرده و با پماد تجویز شده پزشک محل سوختگی را چرب نمایید.

محل سوختگی بعد از باز شدن توسط پزشک معمولا نیازی به پانسمان ندارد مگر در مواردی که پزشک تصمیم بگیرد.



3