



مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه

URMIA IMAM KHOMEINI UNIVERSITY HOSPITAL

برونکوسکوپی

تأیید کننده: خانم دکتر ربیعی پور

فوق تخصص بیماریهای ریه

ومراقبتهای ویژه

تهیه: خانم نجفی کارشناس پرستاری

سال تهیه: بهار ۱۴۰۳


منبع: برونر سودارث داخلی - جراحی



-در صورت تجویز دارو و اسپری های تنفسی مصرف داروها طبق دستور و به موقع در منزل انجام شود.

-در صورت مشکوک بودن به بیماری سل در حد امکان استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی در منزل و تهیه مناسب اتاق استراحت بیمار رعایت گردد.

-در صورت داشتن تب، خونریزی و تنگی نفس هر چه سریع تر به پزشک معالج ویا اورژانس مراجعه کنند.



مراقبت های لازم در منزل بعد از انجام برونکوسکوپی

-به علت بی حسی موضعی ناحیه گلو و حنجره تا ۲ ساعت از خوردن و آشامیدن پرهیز شود.

-در صورت داشتن تنگی نفس، استراحت نسبی با حالت نیمه نشسته رعایت شود.

-در صورت در دسترس بودن اکسیژن تا رفع تنگی نفس استفاده شود.

-در صورت استفاده از آرام بخش های تزریقی حین برونکوسکوپی از انجام کارهایی که نیاز به هوشیاری کامل دارند مثل رانندگی تا ۴ ساعت پرهیز شود.

-در صورت وجود ترشحات غلیظ ریوی از مایعات فراوان استفاده شود و تشویق به سرفه و انجام تمرینات تنفسی انجام شود.

-در صورتی که از ترشحات ریه نمونه جهت آزمایشات ارسال شده است جواب پیگیری و در اسرع وقت به رویت پزشک معالج رسانده شود.

در طول انجام برونکوسکوپی چه اتفاقی می افتد؟

کل عمل برونکوسکوپی معمولا از ۳۰ دقیقه تا دو ساعت طول می کشد این آزمایش به عنوان یک عمل سرپایی و غالبا در بیمارستان انجام می شود.

در حین انجام برونکوسکوپی این مراحل را می گذرانید.

۱- روی یک تخت یا میز دراز کشیده و سرتان به بالا نگه داشته می شود.

۲- پزشک برای حفظ آرامش یک تزریق وریدی در بازو انجام می دهد و این برای کسانی است که صرفا به آرام بخش نیاز دارند برخی افراد ترجیح می دهند حین انجام آزمایش خواب باشند.

۳- معمولا برونکوسکوپی با لوله سخت و انعطاف پذیر به بیهوشی عمومی نیاز دارد شما و پزشکتان تصمیم می گیرید که از کدام روش استفاده کنید.

۴- پزشک از یک اسپری برای بی حس کردن دهان یا بینی و گلو استفاده می کند.

برونکوسکوپی چیست؟

روشی است که به پزشک متخصص ریه اجازه می دهد تا ریه و مجرای هوای بیمار را بررسی کند در این روش یک لوله نازک (برونکوسکوپ) از طریق مجرای دهان یا بینی وارد ریه ها می شود. در انتهای این لوله های نازک یک دوربین و منبع نور تعبیه شده تا پزشک محیط داخل ریه را بهتر ببیند .

چه زمانی به آزمایش برونکوسکوپی نیاز است؟

- تشخیص بیماری یا سایر علل تنگی نفس
- بعد از عکسبرداری یا سی تی اسکن که علائم تومور (سرطان) و یا آسیب ریه در آن مشاهده شده است.
- معاینه و درمان انسداد در مجاری هوایی بیمار
- ارزیابی غدد لنفاوی (بخشی از سیستم ایمنی بدن که در نزدیکی ریه ها است).
- نمونه برداری از مخاط یا بافت.



وقتی که این ناحیه بی حس شد و آرام بخش اثر کرد پزشک لوله برونکوسکوپ را از بینی یا دهان به داخل لوله نای و به ریه ها می فرستد.

بعد از عمل، پزشک به آرامی برونکوسکوپ را خارج می کند متخصص شرایط بیماری را از مانیتور بررسی می کند تا زمانی که کاملا بیدار شوید.