



مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه

URMIA IMAM KHOMEINI UNIVERSITY HOSPITAL

تغذیه و دیابت

تهییه و تنظیم توسط واحد تغذیه بالینی و رژیم درمانی
بیمارستان امام خمینی (ره)

بهار ۱۴۰۳



میزان فعالیت بدنی روزانه خود را افزایش دهید. حداقل ۵ روز در هفته ۴۵-۳۰ دقیقه پیاده روی داشته باشد. در هفته حداقل ۲ روز ورزش بی هوایی مانند کار با وزنه، کش یا دستگاه های باشگاهی جهت تقویت عضلات انجام بدهید.

چربی اضافی گوشت قرمز و پوست مرغ را قبل از پخت جدا نمایید. لبنتیات مصرفی حتما از نوع کم چرب باشد. مصرف غذاهای غنی از کلسترول مانند دل، جگر، قلوه، مغز، زبان، اماع و احشا را محدود کنید.

از مصرف ته دیگ در غذاهای پلویی و ماکارونی خودداری کنید. از غذاهای سرخ شده کمتر استفاده کنید در صورت لزوم از روغن مخصوص سرخ کردنی در مقدار کم استفاده کنید.

در مصرف قندهای طبیعی زیاده روی نشود. عسل یا دوشاب یا سمنو (فقط به مقدار یک قاشق غذاخوری روزانه بلامانع است)، خرما (۱ تا ۲ عدد در روز همراه با گردو)، آبمیوه طبیعی (در صورت استفاده حداکثر نصف لیوان در روز)

چای مصرفی را کم رنگ و کمی سرد میل کنید و همراه یک حبه ریز قند یا دو عدد کشمش یا توت خشک میل شود. از پودر دارچین روزانه به مقدار یک قاشق چای خوری در چای و پلو ها و... استفاده کنید.



دیابت و علایم دیابت

برای بیشتر افراد خوردن غذاهای باقند یا نشاسته باعث افزایش قند خون می شود. با این حال، تفاوت بیماران دیابتی با افراد غیر دیابتی در میزان و مدت زمان افزایش قند خون است. دیابت ملیتوس به گروهی از بیماری ها گفته می شود که با غلظت بالای قند خون در طولانی مدت مشخص می شود.

دیابت به طور قابل ملاحظه ای باعث افزایش در مرگ و میر شده و که با تشخیص درمان آن در مراحل اولیه، میتوان میزان مرگ و میر را کاهش داد.

علایم افزایش قندخون : تشنگی شدید، پرادراری، خستگی

علایم کاهش قند خون : ضربان قلب منظم، عرق سرد، سرگیجه، گشتنگی، عدم توانایی در تکلم، لرزش، اضطراب، تحریک پذیری ، اختلال در بینایی



جهت کنترل بهتر قند خون، غذاهای مصرفی خود را در

۳ وعده اصلی و ۳ میان وعده میل کنید.

وعده های غذایی خود را در ساعات مشخص در روز مصرف کنید.

روزانه میتوانید یک عدد میوه در هر میان وعده میل کنید، اما از مصرف همزمان چند عدد میوه با هم خودداری کنید. مص رف خیار یا هویج همراه میوه در میان وعده ها توصیه می شود. (به طور مثال مصرف خیار با سبب)

بهتر است مصرف حبوبات و سویا خود را به شکل غذاهای پلویی مانند (عدس پلو، باقالی پلو، لوبیا پلو) و خوراک لوبیا، عدسی، انواع آش و سوب افزایش دهید.



بهتر است از نان های سبوس دار مانند نان سنگک سنتی، نان جو، نان بربری، نان تست قهوه ای به جای نان لوаш استفاده کنید.

در وعده صبحانه در اکثر روزهای هفته از تخم مرغ آپز، پنیر کم نمک، عدسی و خوراک لوبیا استفاده کنید و کمتر از کره، مرباء، عسل، سرشیر در وعده صبحانه استفاده نمایید.

از مصرف مواد غذایی دارای قندهای ساده و پرکالری شامل قند، شکر، نوشابه ها، دلستر، کمپوت، آبمیوه های صنعتی، شیرینی، شکلات و تنقلات (چیپس و پفک و...) تا حدامکان خودداری کنید.

3