



ضایعات پاتولوژیک

منبع:

کتاب جراحی دهان، فک و صورت پیترسون

تهیه کننده: طاهره علیاریان

زیر نظر دکتر میرمهدی سیداشرفی

بهار ۱۴۰۳

درمان

درمان ضایعات پاتولوژیک دهان، بستگی به نوع و شدت ضایعه دارد. برخی از روش‌های درمانی عبارتند از:

درمان دارویی: در صورت بروز عفونت، استفاده از داروهای ضد باکتری و ضد ویروسی می‌تواند بهبودی را تسریع کند. همچنین درمان‌های محافظتی و تسکینی مانند ضد التهاب‌ها و ضد دردها نیز برای کاهش علائم استفاده می‌شوند.

روش‌های جراحی ضایعات پاتولوژیک: در برخی موارد، نیاز به جراحی، جهت برداشتن توده‌ها یا درمان عوارض جدی‌تر از ضایعات پاتولوژیک ناحیه فک و صورت وجود دارد.

درمان تحت تمرکز: برخی از ضایعات پاتولوژیک ناحیه فک و صورت می‌توانند نیاز به درمان‌های تحت تمرکز داشته باشند که شامل درمان همزمان با تغذیه مناسب، مراقبت‌های دهانی خاص و ترمیم‌های دندان‌ها است.

پیشگیری

- حفظ بهداشت دهانی صحیح با مسواک زدن دو بار در روز و استفاده از نخ دندان
- مراجعه به دندانپزشک برای معاینات دوره‌ای و درمان بیماری‌های دهانی
- اجتناب از مصرف تنباکو و الکل
- رعایت تغذیه‌ای سالم و متنوع

علائم و نشانه‌ها

علائم و نشانه‌های ضایعات پاتولوژیک دهان می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

- قرمزی، تورم و التهاب در بافت‌های دهانی
- درد یا تحریک منطقه ی آسیب دیده
- ایجاد توده‌های خارجی یا داخلی
- زخم‌ها، ترشحات و خونریزی
- سوءتغذیه و کاهش اشتها

تشخیص

تشخیص ضایعات پاتولوژیک دهان به کمک روش‌های زیر انجام می‌شود:

معاینه بالینی: پزشک متخصص دهان و فک و صورت، می‌تواند با بررسی دقیق دهان و تشخیص اولیه ضایعه، تشخیص صحیح را برای بیمار قائل شود.

آزمایشات تشخیصی: در برخی موارد، پزشک ممکن است نیاز به آزمایشات تشخیصی مانند بافت‌برداری یا بیوپسی از بافت دهانی داشته باشد تا تشخیص نهایی را انجام دهد.



ضایعات پاتولوژیک

ضایعات پاتولوژیک، ضایعاتی هستند که به علت اختلال در نظم بافت سخت و نرم ایجاد می شوند. این ضایعات می توانند کیستیک یا تومورال باشند. ضایعات تومورال می توانند خوش خیم یا بدخیم باشند.

دهان، ناحیه ای است که تغییراتش به راحتی دیده می شود. انجام معاینات منظم به شما در این مورد کمک می کند و شانس بهبودی را افزایش می دهد.

تحقیقات نشان داده است مهم ترین عاملی که در ایجاد سرطان های دهان موثر است استفاده از الکل و تنباکو است. همچنین عوامل دیگری مانند تغذیه نامناسب، بهداشت نامناسب، التهاب ناشی از استفاده از دندان مصنوعی، دندان های ناصاف و عفونت های مزمن نیز در ایجاد سرطان های دهانی موثرند.



1

عوامل موثر در ایجاد ضایعات پاتولوژیک

عوامل عفونی

یکی از علل شایع بروز ضایعات پاتولوژیک، در ناحیه ی فک و صورت، عفونت های باکتریایی و ویروسی است.

برخی از عفونت ها مانند پلاک دندانی و التهاب های لثه می توانند ضایعات پاتولوژیک دهان را ایجاد کنند.

عوامل تغذیه ای

تغذیه ی نامناسب و کمبود برخی از عناصر غذایی نیز می تواند موجب بروز این ضایعات شود. کمبود ویتامین ها و مواد معدنی مهم مانند آهن و ویتامین C می تواند باعث ضعف سیستم ایمنی بدن شده و ضایعاتی در دهان ایجاد نماید.

عوامل تنفسی

استعمال تنباکو، آلودگی هوا و نشستن در محیط های آلوده می تواند منجر به بروز این ضایعات شود.

تنباکو باعث تحریک دهان و آسیب به بافت های دهان می شود و می تواند عامل بروز ضایعاتی مانند سرطان دهان باشد.

2

انواع ضایعات پاتولوژیک

زخم ها

زخم های دهان ممکن است به دلیل آسیب دیدن بافت های دهانی، ناشی از ترمیم یا عوامل دیگری مانند سوختگی، ضربه یا عفونت ایجاد شوند.

التهاب ها

عفونت ها و التهابات مانند التهاب لثه و التهاب دهان ممکن است موجب بروز این ضایعات شوند. این التهابات معمولا به دلیل عفونت های باکتریایی و ویروسی ایجاد می شوند.

تومورها و سیست ها

یکی از انواع این ضایعات می تواند تشکیل توده های بیماری زا مانند سیست ها و تومورها باشد. این توده ها معمولا به صورت تومورهای خوش خیم یا بدخیم مشاهده می شوند.

عفونت های قارچی و ویروسی

عفونت های قارچی مانند عفونت های تخمیری (ترشحات سفید رنگ در دهان) می توانند موجب بروز این ضایعات شوند. عفونت های ویروسی نیز مانند عفونت های قارچی می توانند علت بروز این ضایعات باشد.

3